

# Seizoensgids: Feedervissen op brasem in november

## SEIZOENSGIDS: FEEDERVISSEN OP BRASEM IN NOVEMBER

### WATEROMSTANDIGHEDEN

 Watertemperatuur onder 10°C



### UITRUSTING

 Feederkorf of method-feeder

### AAS

- Donker grondvoer
- Maden, casters
- Mini-boilies


### STEKLOCATIE

 Diep, langzaam stromend Platform, kantplantjes

November brengt de witvisser unieke uitdagingen én kansen. Terwijl de watertemperatuur daalt en brasem zich beweegt naar dieper water, verschuift de aanpak van voer, aas en stektechniek.

## 1. Wateromstandigheden & visgedrag

- Dalende watertemperatuur (6–10°C): vertraagde stofwisseling en minder activiteit.
- Brasem verplaatst zich naar dieper water (3–5 m) nabij structuren zoals stroompijlers.
- Voergewoonten: minder honger, focus op eiwitrijke pellets en vismeel.



## 2. Uitrusting & hengelkeuze

- Feedervissen met losse voerkorf: cage feeders (40–60 g) voor gelijkmatige voerspreiding.
- Feedervissen met method-feeder: platform van 60–80 g voor compacte mix en gerichte aasaanbieding.
- Hoofdlijn 0.18–0.22 mm fluoro of copolymeer (1.5 kg+ breeksterkte).
- Onderlijn 0.14–0.16 mm met haakmaat 12–16 voor subtiele beetregistratie.
- Quiver tips (0.5 oz / 1 oz) voor directe beetdetectie.

### 3. Aas- en voerstrategieën

- Voermix: 50% groundbait, 30% vismeelpallets, 20% fijne pellets (1–2 mm) met minimale bindmiddel.
- Aas: 4–6 mm pellets op hair, mais/micropellets in geel/oranje voor extra zicht.
- Tijdschema: 5–10 worpen met losse feeder voor opbouw, daarna method-feeder op best geteste afstand.
- Onderhoud: 1 steek voer per 10–15 minuten om versheid te behouden.

### 4. Stekanalyse & locaties

- Bodemscan met fishfinder of dobbertrace: modder, zand, hardpack in kaart brengen.
- Zoek hoogteverschillen, gaten en richels waar brasem zich concentreert.
- Structuren: in- en uitstroompunten voor zuurstofrijk water, rietkragen als schuilplaatsen.

### 5. Productaanbevelingen

| Categorie     | Productnaam                               | Toelichting                                        |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cage feeder   | Preston Innovations Cage Feeder 40–60g    | Verschillende gewichten voor opbouw van voerplek   |
| Method-feeder | Fox Matrix Method Feeder Schotel 60g      | Compact platform voor gerichte aasaanbieding       |
| Hoofdlijn     | 0.18–0.22 mm fluoro lijn                  | Ideale dikte voor koude watertemperatuur           |
| Onderlijn     | 0.14–0.16 mm onderlijn met haakmaat 12-16 | Fijne onderlijn voor subtiele beetregistratie      |
| Quiver tip    | 0.5 oz / 1 oz quiver tips                 | Flexibele topjes voor detectie bij lage activiteit |

### 6. Persoonlijke tips & tricks

- Check lokale windrichting en regenradar om juiste kant van de oever te kiezen.
- Begin met feedervissen met cage feeders, schakel na 30 min over op method-feeder.
- Houd een visdagboek bij met stekdata, weersomstandigheden en aaskeuzes.